

## 常見用藥 Q&A

**問題：** 我有消化性潰瘍，醫師幫我開了質子幫浦抑制劑，請問這個藥品什麼時候吃效果最好，跟其他藥品會有交互作用嗎？還有什麼需要注意的事項？

**回覆：**

質子幫浦抑制劑 ( Proton pump inhibitors, PPI ) 的作用是抑制胃酸分泌，目前是消化性潰瘍治療的第一線用藥。此類藥品有些會受到食物影響吸收，建議在每日第一餐飯前 30~60 分鐘服用，以達到最好的抑制胃酸效果。因為此類藥品會影響體內肝臟酵素代謝，可能與一些藥品產生交互作用，例如抗血小板藥品 ( clopidogrel )、抗凝血劑 ( warfarin ) 及癲癇用藥 ( diazepam, phenytoin, carbamazepine ) 等藥品，若有服用這些藥品，請告知您的醫師。另外須注意的是，近期藥品安全資訊風險有提到，此類藥品的使用可能提高困難梭狀芽孢桿菌有關的下痢，建議病人依照醫師處方使用，若經醫師評估後仍有長期使用之必要，有持續水瀉及腹痛情形請立即回診治療。

## 參考資料

1. 臺大醫院藥劑部綜合查詢
2. UptodaTe: Proton pump inhibitors: Overview of use and adverse effects in the treatment of acid related disorders

藥劑部藥師 凌瑞雪